

UBND XÃ MINH CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN HẠNH

**BÀI TUYÊN TRUYỀN
VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỨNG MỞ RỘNG
(Tháng 01/2025)**

Kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể phụ huynh!

Tiêm chủng mở rộng là chương trình mục tiêu quốc gia triển khai nhằm chăm sóc sức khỏe trẻ em. Vậy để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho trẻ chúng ta nên đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch tiêm chủng. Sau đây là một số điều cần biết về chương trình tiêm chủng

1. Lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh

. Lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh: trẻ không bị mắc bệnh đã được tiêm phòng nên tránh được tử vong hoặc di chứng tàn tật; gia đình không tốn tiền bạc, thời gian, công sức chăm sóc con bệnh; không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ; sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng gia tăng; kinh tế gia đình, cộng đồng, xã hội có điều kiện phát triển.

a. Lợi ích của tiêm vắc xin BCG ngừa Lao cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh

Vì tỉ lệ người nhiễm vi khuẩn Lao ở nước ta khá cao (khoảng gần 50% và tỉ lệ mắc bệnh Lao phát hiện được 140 người/100.000 dân) và khó biết ai đang mắc bệnh Lao (có thể là người thân hoặc cả cán bộ y tế) nên cần tiêm phòng vắc xin ngừa Lao cho trẻ càng sớm càng tốt.

b. Lợi ích của tiêm vắc xin ngừa viêm gan B cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh

Vì tỉ lệ người nhiễm virút viêm gan B ở nước ta khá cao (có khoảng 20% dân số và là bệnh rất hay lây) và trẻ mới sinh ra có rất nhiều nguy cơ bị lây nhiễm (qua đường máu) từ mẹ sang con, từ môi trường bệnh viện (chăm sóc rốn, thay băng), tiêm thuốc, truyền dịch... nên tiêm phòng vắc xin viêm gan B cho trẻ càng sớm càng tốt.

2. Những việc cần làm trước khi tiêm vắc xin

Khám sàng lọc: để biết trẻ có dị tật hoặc mắc bệnh gì trước đó không và bệnh đó có chống chỉ định tiêm loại vắc xin nào hay không. Trong trường hợp trẻ có dị tật hoặc mắc bệnh không được tiêm loại vắc xin nào thì phải giải thích rõ cho bà mẹ biết.

3. Những việc cần làm sau khi bé được tiêm vắc xin

Bà mẹ nên cùng bé ngồi lại trong vòng 30 phút vì những phản ứng mạnh thường sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 30 phút sau tiêm vắc xin. Nếu có phản ứng xảy ra sẽ được thầy thuốc xử lý kịp thời.

4. Những dấu hiệu phản ứng ở trẻ sau khi tiêm vắc xin

A. Thường gặp

Những dấu hiệu phản ứng ở trẻ sau khi tiêm vắc xin thường gặp: sốt; sưng, nóng, đau chỗ tiêm, trẻ mệt; trẻ biếng ăn; quấy khóc; nổi ban. Thường trẻ sẽ trở lại bình thường trong vòng 24-48 giờ, nếu phản ứng kéo dài đưa trẻ đi khám ngay.

B. Hiểm gặp

Những dấu hiệu phản ứng ở trẻ sau khi tiêm vắc xin hiểm gặp: là những phản ứng mạnh như: trẻ khóc thét liên tục, sốt rất cao, trẻ khó thở; da, môi tím tái; co giật (hoặc gồng cứng cơ từng cơn)... cần đưa trẻ đi khám ngay.

5. Xử trí những phản ứng sau tiêm

- Khi trẻ có những phản ứng thường gặp thì nên theo dõi trẻ

Cho bé uống paracetamol 15mg/kg thể trọng khi trẻ sốt trên 38 độ để giảm sốt, và lau bằng khăn ẩm cho trẻ.

- Khi trẻ có những phản ứng hiểm gặp thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất

6. Lịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

| Tháng tuổi | Vắc-xin cần tiêm | Mũi tiêm/uống |
|-----------------------------|--|--|
| Sơ sinh (càng sớm càng tốt) | - BCG (phòng lao) - Viêm gan B | - 1 mũi - Vắc-xin viêm gan B trong 24 giờ sau khi sinh |
| 2 tháng tuổi | - Bạch liệt - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib | - Bạch liệt lần 1 - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib mũi 1 |
| 3 tháng tuổi | - Bạch liệt - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib | - Bạch liệt lần 2 - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib mũi 2 |
| 4 tháng tuổi | - Bạch liệt - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib mũi 1 | - Bạch liệt lần 3 - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib mũi 3 |
| 9 tháng tuổi | - Sởi (mũi 1) | - Mũi 1 khi trẻ đủ 9 tháng tuổi |
| 18 tháng tuổi | - Sởi (mũi 2) | - Mũi 2 tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi |